



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 21

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti Circolari Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS -CoV – 2.

Facendo seguito alla riunione in videoconferenza del 13 gennaio e in relazione ad alcuni aspetti sottoposti alla FNOMCeO rivenienti dalle Circolari ministeriali in oggetto rispetto all'intervallo temporale tra l'infezione Covid e la somministrazione della dose di vaccino si evidenziano di seguito i criteri stabiliti nelle suddette circolari ai quali si devono attenere i MMG.

Rispetto ai sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus si raccomanda una unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica:

- a far data da 3 mesi, quindi non prima, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare Ministero della salute 3/3/2021);
- preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare Ministero della salute 21/7/2021).

Pertanto, la dose di vaccino può essere somministrata in un arco temporale dai 3 mesi ai 12 mesi con una raccomandazione per i 6 mesi.

I sanitari che superano i 12 mesi dalla guarigione devono effettuare il prima possibile il ciclo vaccinale completo con somministrazione di 2 dosi (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).

Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la prima dose l'intervallo è di 5 mesi dalla diagnosi di infezione (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Per i sanitari che hanno contratto la malattia entro il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino l'intervallo è di 6 mesi dalla diagnosi di infezione (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).

Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la seconda dose l'intervallo è di 5 mesi per fare la dose booster (Circolare Ministero della salute del 6/12/2021) raccomandata a 4 mesi (Circolare del Ministero della salute del 24/12/2021), anche se ancora non efficace, in quanto necessita di un'apposita ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID – 19.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.