

DIAGNOSI E TERAPIA DEL CANCRO DELLO STOMACO: LA PROSPETTIVA DEL MEDICO DI BASE

Dr.ssa Arianna Alborghetti

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA (2018)

Incidenza in costante declino

Europa: 140.000 casi, 100.000 morti

Italia: 12.700 casi, 10.000 morti

incidenza 10-20 casi/100.000 abitanti

- 4% delle neoplasie in entrambi i sessi
- 6° posto come incidenza, 4° come mortalità
- Picco di incidenza nella settima decade
- Sopravvivenza a 5 anni 25%

FATTORI DI RISCHIO e LESIONI PRECANCEROSE

- **Helicobacter pylori** (atrofia, metaplasia e displasia) ?
- **Fumo** di sigaretta
- **Familiarità** di primo grado
- Consumo di **carne lavorata** (salumi)
- **Polipi gastrici** (FANS e PPI)

SINTOMI

- **Inizialmente aspecifici (ritardo diagnostico)**
- **Dispepsia**
- **Anoressia/calor ponderale**
- **Senso di sazietà precoce**
- **Disfagia**
- **Ematemesi melena e anemia (rare)**
- **Ittero, ascite, fratture (metastasi)**

QUANDO E' INDICATA LA GASTROSCOPIA?

- Disturbi dell'addome superiore persistenti dopo terapia appropriata
- Disturbi dell'addome superiore in pazienti di età > 45 anni
- Anoressia e calo ponderale
- Vomito persistente
- Sanguinamento gastrointestinale se colonscopia negativa
- Familiarità di primo grado

GRAZIE PER L'ATTENZIONE